 <p>Regione Lombardia ASL Bergamo</p>	<p><b>ASL DELLA PROVINCIA DI BERGAMO</b></p> <p>COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE</p>	 <p>Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Bergamo</p>
--	---	--

## **PREPARAZIONE E CONDIZIONI NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DI ISTEROSALPINGOGRAFIA**

### **Per poter eseguire l'isterosalpingografia è necessario che la donna**

- abbia assoluta certezza di non essere in stato di gravidanza; per tale motivo occorre avere rapporti sessuali protetti o astenersi da rapporti sessuali completi dall'inizio del ciclo mestruale fino all'esecuzione dell'esame.
- non abbia sanguinamento dai genitali; è quindi indicato che effettui l'esame 24-48 ore dopo il termine della mestruazione
- non sia affetta da infezioni genitali; è indicata l'effettuazione di tampone vaginale
- non abbia allergie al mezzo di contrasto (mdc); infatti, tenuto conto del parziale riassorbimento del mezzo di contrasto possono verificarsi alcune reazioni allergiche, anche tardivamente

### **e si sottoponga alla seguente preparazione**



- digiuno da almeno 4 ore prima dell'esame
- clistere di pulizia il giorno dell'esame, prima di presentarsi in Radiologia
- accurata pulizia dei genitali esterni

**In relazione a quanto sopra specificato, si consiglia di rivolgersi direttamente al Servizio di Radiologia (tel.           ) per concordare con gli operatori il giorno di esecuzione dell'indagine.**

**Si raccomanda di portare eventuale documentazione precedente (esami radiologici e/o ecografici con i referti) relativa alla richiesta e l'esito del tampone vaginale.**

**In caso di rinuncia si prega di avvisare tempestivamente chiamando il numero telefonico**

**N.B.** Dopo l'esame è prevista una permanenza in osservazione di circa 30 minuti presso la struttura.

 <p>Regione Lombardia ASL Bergamo</p>	<p><b>ASL DELLA PROVINCIA DI BERGAMO</b></p> <p>COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE</p>	 <p>Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Bergamo</p>
--	---	--

## ПОДГОТОВКА И НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ISTEROSALPINGOGRAFIA

### Для проведения Isterosalpingografia необходимо, чтобы

- женщина была абсолютно уверена, что она не беременна; для этого необходимо воздержаться от половых контактов либо иметь защищенные половые контакты от начала менструального цикла до момента проведения анализа.
- у женщины не было выделения крови из половых органов; для этого рекомендуется проводить анализ через 24-48 часов после окончания менструации
- у женщины не было инфекции половых органов, для этого рекомендуется применение *tampone vaginale* (вагинального тампона)
- у женщины не было аллергии на *mezzo di contrasto (mdc)* (средство контраста); следует учитывать то, что из-за частичного впитывания средства контраста могут выявляться аллергические реакции, даже по прошествии довольно длительного времени.

### и чтобы она выполнила следующие подготовительные рекомендации

- не принимать пищу по меньшей мере в течение 4 часов до анализа
- клизма в день проведения анализа, до прибытия в отделение **Radiologia**
- чистота внешних половых органов

**В связи со всем вышеперечисленным, рекомендуется обращаться непосредственно в Servizio di Radiologia (тел.     ), для выбора даты проведения анализа.**

**Рекомендуется иметь с собой предыдущие результаты анализов (радиографию и/или эхографию), относящиеся к запросу либо результату *tampone vaginale* (вагинального тампона).**

**В случае отказа от анализа необходимо своевременно сообщить об этом по телефону**

**N.B.** После проведения анализа пациентка остается под наблюдением в течение 30 минут.