



**PREPARAZIONE A TC
CON MEZZO DI CONTRASTO IODATO ENDOVENOSO**

(da compilare a cura del Medico prescrittore, barrando ove necessario. Si prega cortesemente di rispondere a tutte le domande indicate)

Il/La Sig/Sig.ra ha la necessità di essere sottoposto/a a per la seguente indicazione.

Pacientja është shtatzane (e sigurtë apo e supozuar) ose në fazë dhënie qjiri: **po (si) jo (no)**
La paziente è in stato di gravidanza (certa o presunta) o in fase di allattamento

Është e prekur nga

Presenta in anamnesi:

Po (si) jo (no)

- Paraproteinemia di Waldenström
- Jo suficienzë epatite e rëndë (*Insufficienza epatica grave*)
- Jo suficienzë veshkore e moderuar/e rrëptë (*Insufficienza renale moderata/severa*)
- Mielomë e shumëfishtë (*Mieloma multiplo*)
- Gjendje të rënda vuajtjeje miokard/muskul i zemrës ose jo suficienzë e qarkullimit të gjakut në zemër (*Stati di grave sofferenza del miocardio o di insufficienza cardiorespiratoria*)
- Tiroide (Ipertireosi)
- Diabet në trajtim me Metformina (*Diabete in trattamento con Metformina*)
- Është në vazhdim terapie kundërmpiksës (*E' in corso terapia anticoagulante orale*)

Po (si) jo (no) PARAQET ALLERGJI	IN CASO AFFERMATIVO INVIARE IL PAZIENTE ALLA STRUTTURA CHE ESEGUIRÀ L'INDAGINE
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> DIATESI ALLERGICA	

Sillni rezultatet e egzameve hematokimike të mëposhtme (të konsiderueshëm të vlefshëm brenda 30 ditëve nga egzekutimi i tyre)

Il paziente deve presentarsi il giorno dell'esame con gli esiti recenti (massimo 30 giorni precedenti la data di esecuzione dell'esame) di:

- **CREATININEMIA**
- **GLICEMIA**

Data

Firma del medico

VËRE ME KUJDES. TC e kraharorit dhe e barkut efektohet të paktën mbas 2ditësh nga egzekutimi i kërkimeve të tjera kontrastografike (studime radiografie të aparatit tretës, urografi, intervencionist e të tjera...) dhe nga eksekutimi i analizave endoskopike.

N.B. La TC del torace e dell'addome va effettuata dopo almeno 2 giorni dall'esecuzione di altre indagini contrastografiche (studi radiografici dell'apparato digerente, urografia, interventistica, ecc...) e dall'esecuzione di indagini endoscopiche.

PËRGATITJA PËR EGZAM ME MJET KONTRASTI **PREPARAZIONE ALL'ESAME CON MEZZO DI CONTRASTO**

Hidratim i bollshëm (të paktën 1,5 litra uji) ditën para analizës.

Pa ngrënë ushqime të thata dhe të lëngshme nga të paktën 4 orë para egzamit.

Të vazhdohet terapia e zakonshme shtëpiake sipas udhëzimeve të doktorit familjar me përjashtim të

- Metformina e cila duhet të ndërpritet dy ditë para analizës.
- β -blokus dhe ACE- inhibitori duhet te ndërprisen në ditën e analizës(sepse mund te ngrene tensionin dhe te bejnë të pa vlefshëm trajtimin).

Abbondante idratazione (almeno 1.5 litri di acqua) il giorno prima dell'esame.

Digiuno per cibi solidi e liquidi da almeno 4 ore prima dell'esame.

Assumere l'abituale terapia domiciliare secondo l'indicazione del proprio medico di base ad esclusione di

- *Metformina che deve essere sospesa nei due giorni precedenti l'esame*
- *β -bloccanti ed ACE-inibitori che devono essere sospesi il giorno dell'esame (perchè possono aggravare le ipotensioni e rendere inefficace il loro trattamento).*

VËRE ME KUJDES

- Kujtohet se **pazienti/pacientja duhet të jetë e/i shoqëruar nga një person në gjendje të ngasë makinën**, si do nga një person në moshë të rritur, përgjegjës, sepse ilaçet e marra gjatë egzamit munden të komprometojnë ngarjen e makinës në orët e mbasme
- Mundet të jetë e parashikuar, mbas egzamit qëndrimi në strukturë mbas egzamit, një qëndrim prej të paktën 30 minutash.

NOTA BENE

- *si ricorda che il/la paziente dovrà essere accompagnato/a da una persona in grado di guidare, comunque da una persona maggiorenne responsabile, in quanto i farmaci somministrati durante l'esame possono compromettere la guida nelle ore successive l'indagine*
- *potrebbe essere prevista, dopo l'esame, una permanenza in struttura per almeno 30 minuti.*